

II. TESIS DE POSGRADO



MAESTRÍA



211 **Factores de riesgo relacionados con el bajo peso de recién nacidos atendidos en el hospital San Martín de Porres de Macusani - Puno, año 2010**

Cusi Mamani, Ezequiel

RESUMEN

Se determinó los factores de riesgo relacionados con el bajo peso al nacer, de los recién nacidos atendidos en el Hospital San Martín de Porres de Macusani - Puno, durante el año 2010. Se efectuó un estudio, observacional, analítico de casos y controles con sentido retrospectivo. Se comparó 60 casos con diagnóstico confirmado de bajo peso al nacer y 120 controles. Se hizo el análisis bivariado y, finalmente, se aplicó la regresión logística. La prevalencia del bajo peso al nacer en el año 2010, fue de 23.52 %. Los factores de riesgo sociodemográficos asociados al bajo peso al nacer, fueron el nivel de pobreza, pobre extremo con un OR 12,730 (p 0,002) y el pobre no extremo OR 3,219 (0,026). Los factores de riesgo maternos asociados al bajo peso al nacer fueron: el período intergenésico corto con un OR de 3,196 (p 0,019).

PALABRAS CLAVE: Recién nacido, Factores de riesgo, Peso al nacer.

ASESOR: Tejada Vásquez, Edgar
TÍTULO: Salud Pública - 2011

212 **Asistencia del médico pediatra a la cesárea: Estudio del costo de oportunidad. Hospital Daniel Alcides Carrión ESSALUD – Tacna**

Neyra Pinto, Julio César

RESUMEN

Objetivo. Determinar el costo de oportunidad de la presencia obligatoria del pediatra en todas las cesáreas. También determinar si ocurre una mayor frecuencia de reanimación en los recién nacidos del grupo —parto abdominal en comparación a los recién nacidos del grupo —parto horizontal. **Metodología.** Es un estudio transversal, descriptivo y analítico. La información recolectada fue procesada en SPSS v18. **Resultados.** Los datos muestran un alto costo de oportunidad, estando el pediatra 38 minutos en promedio por cada cesárea, además no hubo diferencias en las maniobras de reanimación ofrecidas a los neonatos de ambos grupos. **Conclusiones.** Se demuestra que el costo de oportunidad es elevado. La prevalencia de reanimación fue del 2,2%

PALABRAS CLAVE: Cesárea, Recién nacido

ASESOR: Álvarez Becerra, Rina María
TÍTULO: Salud Pública - 2015

213 **Nivel de adherencia a la suplementación con sulfato ferroso en gestantes que acuden al control prenatal en los establecimientos de Salud de la Microred Metropolitana de Tacna, 2014**

Rojas Silva, Luisa Consuelo

RESUMEN

La anemia en el embarazo representa un grave problema de salud pública; la suplementación con sulfato ferroso, asociada a la adherencia de su uso es una estrategia efectiva para su abordaje. La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de adherencia a la suplementación con sulfato ferroso en las gestantes que acudieron al control prenatal en los establecimientos de la Micro red Metropolitana de Tacna en el año 2014. Se realizó un estudio de tipo no experimental, descriptivo, prospectivo, observacional en donde participaron 327 gestantes a las que se les había prescrito suplementación con sulfato ferroso en el mes anterior. En los resultados se evidenció que las gestantes presentaron un nivel de adherencia parcial (69,40%), las características sociodemográficas de la población de estudio fueron: edades entre 18 y 29 años (60,55%); instrucción secundaria (57,80%); amas de casa (59,94%); estado civil conviviente (67,89%); residencia estable (88,99%) y religión católica (80,70%). Los componentes de la adherencia revelan que una gran mayoría se limita al cumplimiento de indicaciones, el gran potencial que representa mejorar la relación proveedor-usuaria y potenciar el uso de recursos que apoyen la suplementación.

PALABRAS CLAVE: Cumplimiento de medicación, Mujeres embarazadas, Sulfato ferroso.

ASESOR: Gómez Zapana, Gerson Roberto
TÍTULO: Salud Pública - 2017

214 **Nivel educativo y su relación con la adolescente embarazada en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2013**

Ayma Jiménez, Marleni Mary

RESUMEN

El problema de investigación se centró en determinar cómo se asocian la variable nivel educativo y el embarazo en la adolescencia. El objeto de estudio fueron las adolescentes de 12 a 19 años que se atendieron en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

El diseño de investigación fue no experimental, transversal, y relacional. La población de estudio estuvo conformada por 195 mujeres adolescentes de 12 a 19 años. Se utilizó un instrumento de recolección de datos, los que fueron cumplimentados por las mujeres en un periodo de cinco meses. Se ha concluido que el nivel de escolaridad y el embarazo en adolescentes se relacionan significativamente. ($P=0,025$).

PALABRAS CLAVE: Embarazo en adolescencia, Conocimiento académico.

ASESOR: Chaparro Guerra, Américo

TÍTULO: Salud Pública - 2018

DOCTORADO



215 **Factores de riesgo para anemia ferropénica en gestantes adolescentes de la Micro Red de Salud Cono Norte de Tacna, 2014**

Chambilla Quispe, Vicente Freddy

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores de riesgo para anemia ferropénica en las gestantes adolescentes de la Micro Red de Salud Cono Norte de Tacna en el 2014. **Metodología:** diseño no experimental. La muestra fue de 92 gestantes adolescentes. Principales resultados: a) De los factores sociodemográficos, el nivel socioeconómico bajo se asocia significativamente (P: 0,012; OR: 4,778) con la anemia ferropénica en gestantes adolescentes; b) De los factores de riesgo mórbidos la ausencia de tratamiento preventivo de anemia (P: 0,001; OR: 8,965), y la duración de la menstruación de más de cuatro días (P: 0,044; OR: 5,057), se asoció significativamente con la anemia ferropénica en gestantes. **Conclusión:** De los factores de riesgo mórbidos la ausencia de tratamiento preventivo de anemia (P: 0,001; OR: 8,965), y la duración de la menstruación de más de cuatro días (P: 0,044; OR: 5,057), se asoció significativamente con la anemia ferropénica en gestantes.

PALABRAS CLAVE: Embarazo en adolescencia, Factores de riesgo, Anemia ferropénica,

ASESOR: Miranda Benavente, Jaime Edgar
TÍTULO: Epidemiología - 2017

216 **Efecto del programa dialacta en el nivel de conocimientos y actitudes hacia la lactancia materna en gestantes del CLAS Centro de Salud Metropolitano, Tacna-2014**

Del Carpio Peñaloza, Rosario Karina

RESUMEN

El presente estudio de investigación se realizó en el Clas Centro de salud Metropolitano 2014 -Tacna; es de tipo cuantitativo, cuasi experimental, grupos intactos, antes y después con grupo control, cuyo objetivo es Determinar el efecto del programa DIALACTA en el nivel de conocimientos y actitudes hacia la Lactancia materna en gestantes del Clas Centro de Salud Metropolitano-2014. La muestra estuvo constituida por 60 gestantes de las cuales 30 fueron parte del grupo experimental y 30 el grupo control. Los instrumentos fueron un cuestionario sobre conocimientos y actitudes. Cuyo resultado fueron: Que no existe diferencias estadísticamente significativas, entre la actitud hacia la lactancia materna en las dimensiones cognitiva, afectiva y conativa antes de la aplicación del programa Dialacta, alcanzado por las gestantes del grupo experimental y control ($P:>0,05$). Existen diferencias significativas, entre la actitud hacia la lactancia materna en la dimensión cognitiva, afectiva y conativa después de la aplicación del Programa Dialacta en las gestantes del grupo experimental y control

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna, Estrategias de la educación, Programa dialecta.

ASESOR: Miranda Benavente, Jaime Edgar

TÍTULO: Epidemiología - 2017

Montalvo Chávez, Patricia Verónica

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo general determinar la prevalencia y los factores asociados a las dislipidemias en niños y adolescentes del distrito de Tacna, 2014. El diseño de investigación fue descriptivo transversal y relacional, se recolectaron muestras de sangre a 434 niños de nivel primario y 431 adolescentes para el nivel secundario; los tipos de factores que se analizaron fueron: Biológicos (edad, sexo, peso al nacer, estado nutricional), familiares (infarto cardíaco, angina de pecho, accidente cerebro vascular, diabetes, obesidad, entre otros), estilos de vida (dieta rica en grasas saturadas y en azúcares refinados, actividad física, tabaquismo). Los resultados se analizaron mediante el software estadístico SPSS 20,0, presentándose en tablas y figura de barras de frecuencias. Se concluyó que existe asociación con el factor biológico de peso al nacer, antecedentes familiares como el dolor de pecho de padres, colesterol alto de padres, diabetes mellitus en padres y abuelos y estilos de vida como la alimentación rica en grasas saturadas y colesterol y actividad física inactiva o poco activa.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, Mujeres embarazadas, Seguro de salud, Servicios de salud, Tacna (Dpto).

ASESOR: Tejada Vásquez, Edgar Hernán
TÍTULO: Epidemiología - 2018