

III. SEGUNDA ESPECIALIDAD



218 **Eficacia de un programa personalizado de lactancia materna en relación a los reingresos de neonatos por deshidratación e ictericia en el Hospital Daniel Alcides Carrión ESSALUD. Tacna – 2010**

Ticona Paco, Yuvel Soledad

RESUMEN

Motivo frecuente de readmisión hospitalaria es la deshidratación asociada o no a ictericia, que, al no ser intervenidas adecuadamente, pueden interferir en la calidad de vida de los neonatos, condicionando alteraciones neurológicas y por ende secuelas a largo plazo. Bajo este contexto la investigación tiene como objetivo: Evaluar la Eficacia de un Programa Personalizado de Lactancia Materna en relación a los reingresos de neonatos por deshidratación e ictericia en el Hospital Daniel Alcides Carrión EsSalud. Tacna- 2010. Estudio de cohorte observacional, analítico, longitudinal y prospectivo, donde se consideró a dos grupos de púerperas: al grupo intervenido se les aplicó las técnicas: de entrevista, observación y consejería personalizada. Los resultados muestran una disminución en los reingresos de 5.82 % en el segundo trimestre (sin intervención), a 2.18 % en el tercer trimestre (con intervención); siendo el porcentaje de déficit de peso de 5 a 10 % un riesgo para el niño al alta. El Programa Personalizado de Lactancia Materna es EFICAZ, ya que aseguró el inicio temprano de la lactancia materna y la educación continua durante la hospitalización.

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna, Ictericia, Recién nacidos, Deshidratación.

ASESOR: Silva Cornejo, María Del Carmen
TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2012

219 **Eficacia del rol educador del Profesional de Enfermería sobre lactancia materna en relación a los reingresos de neonatos por deshidratación hipernatrémica, Hospital Hipólito Unanue de Tacna-2013**

Orocollo Jamachi, Haydee Otilia

RESUMEN

La presente investigación titulada Eficacia del rol educador del profesional de enfermería sobre lactancia materna en relación a los reingresos de neonatos por deshidratación hipernatrémica. Hospital Hipólito Unanue de Tacna -2014; es de tipo cohorte, observacional, analítico y prospectivo, con una muestra de 60 madres con neonatos. Tuvo como objetivo determinar la eficacia del rol educador del profesional de enfermería sobre lactancia materna en relación a los reingresos de neonatos con deshidratación hipernatrémica llegando a las siguientes **conclusiones:** Se determinó que el nivel de conocimiento de las madres en el pre test es de 70% (42) conocimiento regular y el 21.67 % (13) tienen un conocimiento malo. Se determinó que el nivel del conocimiento de las madres en el post test el 93.33 % (28) tienen un conocimiento bueno y el 3.33 % (1) se mantuvo con conocimiento malo en el post test; viéndose de esta manera que con la educación, enseñanza y supervisión a través de un programa educativo el conocimiento de las madres mejora significativamente durante su estancia hospitalaria.

El programa especializado de lactancia materna en el grupo de madres intervenidas ha demostrado eficacia por la disminución de incidencia de reingresos de neonatos con deshidratación hipernatrémica al hospital donde se evidencia que el grupo de estudio los que recibieron educación reingresaron 3.33 %(1) y los que no recibieron educación el reingreso de neonatos fueron en un 20 %(6) ($p < 0,035$).

PALABRAS CLAVE: Deshidratación, Lactancia materna, Recién nacido, Rol de la enfermera.

ASESOR: Manrique Tejada, Ingrid

TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2014

220 **Eficacia de la glucosa en el dolor de los neonatos a término sometidos a punción de talón de Hospital Daniel Alcides Carrión. Tacna-2014**

Chocano Rodríguez, Ana María

RESUMEN

A todos los recién nacidos se les realiza el tamizaje metabólico, siendo sometidos a punción talón, con el objetivo de prevenir la discapacidad intelectual y muerte, mediante la detección temprana y manejo de errores del metabolismo; la cual constituye una experiencia dolorosa para el recién nacido. En ocasiones el dolor es subvalorado y apenas tratado, pero se ha reportado que la glucosa es efectiva para disminuir el dolor. Bajo este contexto la investigación tiene como objetivo: Evaluar la eficacia de la glucosa en el alivio del dolor en neonatos a término sometidos a punción de talón en el Hospital III Daniel Alcides Carrión. Tacna-2014. Este estudio es de tipo cuantitativo, método experimental, de intervención con grupo control, donde se consideró a 80 recién nacidos a término, a 40 neonatos se les administró glucosa al 30% y la diferencia se les administró agua estéril. Ambos casos se los evaluó con la escala de dolor- NIPS. Los resultados muestran, que el 47,5% presentan dolor con el uso del agua estéril, mientras que el 45,0% no presentan dolor con el uso de la glucosa. Se concluye que la glucosa al 30% es eficaz para disminuir el dolor en los neonatos a término ante la punción talón.

PALABRAS CLAVE: Recién nacido, Glucosa.

ASESOR: Ticona Paco, Yuvel Soledad

TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2015

221 **Factores que influyen en la lactancia materna exclusiva, en las madres atendidas en el consultorio de crecimiento y desarrollo del C.S. Metropolitano Tacna 2014**

Peña Quispe, Dionisia Isabel

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo determinar los factores que influyen en la lactancia materna exclusiva en las madres atendidas en el consultorio de crecimiento y desarrollo del C.S. Metropolitano, es un estudio cuantitativo, de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 87 madres con niños menores de 6 meses que acuden al consultorio de crecimiento y desarrollo, la técnica fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario, en el procesamiento de datos se usó el software estadístico (SPSS) versión 21.0. **Resultados:** el 64,4% de las madres brindan lactancia materna exclusiva. El 33,4% tienen edades entre 18 a 29 años, el 32,2 % tienen instrucción superior, el 42,6% son amas de casa, el 59,8% producen leche en cantidad suficiente, el 40,2% tienen temor a no producir leche en cantidad suficiente, el 46% tiene conocimientos sobre lactancia materna y los niños tienen lactancia materna exclusiva. **Conclusiones:** Existe influencia estadísticamente significativa entre factores biológicos: producción de leche, formación de pezones, factores psicológicos: temor a no producir leche la cantidad suficiente, factores sociales: edad, nivel de escolaridad y factores económicos: ocupación, con la lactancia materna exclusiva.

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna, Factores biológicos.

ASESOR: Tipacti Sotomayor, Elide

TÍTULO: Cuidado Enfermero en Crecimiento y Desarrollo - 2016

222 **Satisfacción de las madres acompañantes sobre los cuidados de enfermería del Servicio de Neonatología del Hospital Hipólito Unanue. Tacna 2017**

Aburto Quispe, Susan Greta

RESUMEN

Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción de las madres acompañantes sobre los cuidados de enfermería del servicio de Neonatología del Hospital Hipólito Unanue, la población de estudio estuvo constituida por 60 madres acompañantes de los recién nacidos en el periodo de enero a febrero 2017, la información se recolectó mediante la aplicación de una encuesta compuesta de 30 preguntas. Resultados: Predomina el nivel medianamente favorable de satisfacción de las madres acompañantes sobre los cuidados de enfermería del servicio de neonatología con 72,9% seguido del nivel favorable (15,3%) y desfavorable (11,9%).

PALABRAS CLAVE: Atención de enfermería, Satisfacción del paciente, Enfermería pediátrica.

ASESOR: Silva Cornejo, María del Carmen
TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2017

Percepción de la calidad del cuidado enfermero(a) y su relación con la satisfacción de los padres de los recién nacidos del Hospital III Daniel Alcides Carrión ESSALUD, Tacna 2014

García Solorzano, Judith Violeta

RESUMEN

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo, prospectivo, transversal y correlacional; tuvo el objetivo de Determinar la percepción de la calidad del cuidado enfermero(a) y su relación con la satisfacción de los padres de los recién nacidos del Hospital III Daniel Alcides Carrión Essalud, Tacna 2014. Con una muestra de 73 padres de los recién nacidos. Se aplicó 2 instrumentos. Obteniendo los siguientes resultados: La mayoría de padres de los recién nacidos reportaron nivel de percepción de la calidad del cuidado enfermero(a) eficiente y en minoría deficiente. El grado de satisfacción de los padres de los recién nacidos, en su mayoría fue satisfecho y en minoría insatisfecho. Existe relación entre la: percepción de la calidad del cuidado enfermero(a) y la satisfacción de los padres de los recién nacidos mediante la prueba chi cuadrado (X^2).

PALABRAS CLAVE: Atención de enfermería, Satisfacción del paciente, Calidad de la atención de salud, Recién nacido.

ASESOR: Quispe Prieto, Silvia Cristina
TÍTULO: Cuidado Materno Infantil con Mención en Neonatología - 2017

Acho Pongo, Susana Miriam

RESUMEN

El presente estudio de investigación que tuvo el objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de protección personal de las enfermeras del servicio de Neonatología del Hospital III Daniel Alcides Carrión Essalud, Tacna 2017. De tipo descriptivo, de corte transversal y correlacional. Con una muestra de 15 enfermeras. Se aplicó 2 instrumentos. Obteniendo los siguientes resultados: La mayoría de las enfermeras del servicio de Neonatología en un 60% tienen de 20 a 45 años de edad; el 100% son del sexo femenino; el 40% tiene de 11 a 20 años como tiempo de servicio y el 66,7% son de condición laboral contrato indeterminado. La mayoría de las enfermeras en un 60% tienen nivel de conocimiento de las medidas de protección personal muy bueno. La mayoría de las enfermeras en un 80% presentaron aplicación óptima de las medidas de protección personal. Conclusión: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de protección personal de las enfermeras. A través de la prueba X^2 ($p < 0,05$).

PALABRAS CLAVE: Enfermeras neonatales, Protección personal.

ASESOR: Tipacti Sotomayor, Elide

TÍTULO: Cuidado Materno Infantil con Mención en Neonatología - 2018

225 **Factores socioculturales y su relación con la lactancia materna en madres de los recién nacidos del Servicio de Neonatología del Hospital III Daniel Alcides Carrión ESSALUD, Tacna 2017**

Estela Mamani, Bertha Karin
Marin Veliz, Martha Lourdes

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo el objetivo de determinar la relación entre los factores socioculturales y la lactancia materna en madres de los recién nacidos del Servicio de Neonatología del Hospital III Daniel Alcides Carrión EsSalud, Tacna 2017. Estudio de tipo cuantitativo, diseño descriptivo correlacional y una población de 67 madres. Se aplicó dos instrumentos: Cuestionario sobre el Nivel de conocimiento de lactancia materna y la lista de cotejo sobre la técnica de lactancia materna. Se concluye que: Los factores socioculturales de las madres en su mayoría (64,2%) tuvieron de 18 a 35 años de edad; el 68,8% lugar de procedencia Tacna y el 70,2% de religión católica. Poco más de la mitad (50,7%) grado de instrucción secundaria y; menos de la mitad (46,3%) ocupación ama de casa y el (47,9%) estado civil conviviente. Más de la mitad (55,2%) presentaron nivel de conocimiento promedio; y (56,7%) técnica de amamantamiento incorrecta. Existe relación significativa entre los factores socioculturales y el nivel de conocimiento y no existe relación significativa entre los factores socioculturales y la técnica de amamantamiento, demostrado a través de la prueba X².

PALABRAS CLAVE: Factores culturales, Lactancia materna, Recién nacido.

ASESOR: Tipacti Sotomayor, Elide
TÍTULO: Cuidado Materno Infantil con Mención en Neonatología - 2018

226 **Incidencia de macrosomía en el recién nacido y factores asociados a complicaciones en el Servicio de Neonatología Hospital Ilo en el año 2017**

Huallpa Colana, Betty Ana

RESUMEN

Esta investigación, tuvo como objetivo determinar la incidencia de macrosomía en el recién nacido y factores asociados a sus complicaciones en el Servicio de Neonatología del Hospital Ilo en el año 2017. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, correlacional. La población fue 710 recién nacidos, la muestra 94 neonatos macrosómicos (peso \geq 4000 gr), el instrumento fue una ficha de recolección de datos. Resultados: la Incidencia es de 13,24% recién nacidos macrosómicos. Los factores asociados a complicaciones, con frecuencia son el sexo masculino, Apgar del recién nacido entre 7-9, edad gestacional de 40 semanas promedio y el parto eutócico, las madres tiene en promedio 27 años de edad, talla promedio 1,55m.; el 20,2% iniciaron el embarazo con sobrepeso y el 22,3% tuvieron infección urinaria durante el embarazo; como patología materna prima la obesidad 27,7%. Son complicaciones frecuentes en el recién nacido macrosómico la depresión respiratoria 20,2%; Cáput Sucedaneum y la Hipoglicemia. Conclusiones: Las complicaciones del recién nacido macrosómico se relaciona directamente con peso menor de 4500gr, ($p=0.001$); edad gestacional de 37 a 41 semanas ($p=0.046$) y existe relación significativa entre la obesidad materna y las complicaciones del recién nacido macrosómico, ($p=0.00$).

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, Macrosomía fetal, Peso al nacer, Recién nacido.

ASESOR: Tipacti Sotomayor, Elide

TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2018

227 **Relación del contacto piel a piel y la pérdida de peso del recién nacido en el Hospital Regional Moquegua, 2017**

Ticona Checalla, Luzvenia Milagros

RESUMEN

El presente estudio tuvo como **Objetivo:** Determinar la relación del contacto piel a piel y la pérdida de peso del recién nacido en el Hospital Regional Moquegua, 2017. **Metodología:** La investigación es de tipo relacional, no experimental y retrospectivo; que se realizó en el Hospital Regional Moquegua, 2017, cuya población fue de 135 historias clínicas de recién nacidos, donde se extrajo la muestra de 100 historias clínicas de recién nacidos. Para medir las variables se aplicó un formato de recolección de datos. **Resultados:** El contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido es inmediato en un 66% y precoz en un 34%, apreciándose que la pérdida de peso del recién nacido es adecuada en un 70% e inadecuada en un 30%. **Conclusiones:** Existe una relación significativa entre el contacto piel a piel y la pérdida de peso del recién nacido, aplicando la prueba del chi cuadrado con un valor $P=0.027$.

PALABRAS CLAVE: recién nacido, Peso al nacer, Pérdida de peso, Relación madre-hijo.

ASESOR: Maldonado de Zegarra, Elva
TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2019

228 **Factores socioculturales, conocimiento y éxito en la lactancia materna en madres puérperas del Servicio de Neonatología Hospital Hipólito Unanue Tacna – 2018**

Apaza Tacca, Sonia Rosario
Flor Palao, Nataly Melissa

RESUMEN

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores socioculturales, el conocimiento y el éxito en la lactancia materna en madres puérperas del servicio de neonatología Hospital Hipólito Unanue Tacna - 2018. El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 132 madres puérperas, a quienes se les aplicó el cuestionario sobre conocimiento de la lactancia materna y la Ficha de registro de éxito de la lactancia materna. Como resultado se obtuvo que en los factores socioculturales la mayoría de las madres puérperas, tuvo edades de 18 a 29 años (62,9%); (52,3%) con Grado de Instrucción Secundaria Completa; (79,5%) con religión católica; (75,0%) idioma castellano; (58,3%) lugar de procedencia Tacna; En cuanto al conocimiento sobre la lactancia materna, más de la mitad (62,9%) tiene Conocimiento Medio y la mayoría (92,4%) tiene Éxito en la Lactancia Materna. Con la prueba del Chi cuadrado mostramos que no existe relación significativa entre los factores socioculturales y el conocimiento con el éxito de la lactancia materna.

PALABRAS CLAVE: Factores culturales, Lactancia materna, Periodo posparto.

ASESOR: Vela de Córdova, Victoria Nora
TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2019

Comunicación terapéutica de la enfermera y su relación con el nivel de satisfacción de las madres de neonatos hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Hipólito Unanue Tacna 2018

Huerta Humpiri, Lizbeth Lourdes

RESUMEN

Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y de corte trasversal cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre la comunicación terapéutica de la enfermera y el nivel de satisfacción de las madres de neonatos hospitalizados en el servicio de neonatología del Hospital Hipólito Unanue, la población de estudio estuvo constituida por 50 madres de los recién nacidos hospitalizados en el período de diciembre del 2017 a Febrero del 2018, la información se recolectó mediante la aplicación de dos encuestas: Una para medir la comunicación terapéutica con 21 preguntas y otra para medir la satisfacción con 26 preguntas. Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba de Chi – Cuadrado, con un nivel de significancia de 0.05, por tal se obtuvo como resultado: No existe relación entre la comunicación terapéutica de la enfermera y el nivel de satisfacción de las madres de neonatos hospitalizados; además en el 28% de las enfermeras la comunicación terapéutica se encuentre medianamente presente; en el 14% de las enfermeras se encuentra presente la comunicación terapéutica y en el 8% de las enfermeras no se encuentra; se obtuvo también que en el 31% de las madres la satisfacción se halla en un nivel medio.

PALABRAS CLAVE: Cuidados en enfermería, Satisfacción del paciente, Calidad de la atención de salud, Recién nacido.

ASESOR: Quispe Prieto, Silvia Cristina

TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2019

Satisfacción del contacto piel a piel y el inicio de la Lactancia Materna en Madres púerperas del Hospital Hipólito Unanue de Tacna – 2019

Anchapuri Catacora, Yeny Carmen
Limache Vargas, Maritza Giovanna

RESUMEN

Esta investigación tuvo como **Objetivo** Determinar la relación entre la satisfacción del contacto piel a piel y el inicio de la lactancia materna en madres púerperas del hospital Hipólito Unanue de Tacna. La **Metodología** del estudio es: tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal con diseño correlacional. La población fue considerada del registro de partos del primer trimestre del año 2018 considerando a madres de parto eutócico, siendo 317 madres. La muestra estuvo compuesta de 174 madres. Los datos fueron recolectados mediante la encuesta con la aplicación de un instrumento y una guía de observación. Los **Resultados** fueron: el 41,4% de las madres púerperas tenían entre los 24 – 31 años, el 82,8% eran conviviente, el 61,5% tenía grado de instrucción secundaria. El 92% refirió satisfacción en el contacto piel a piel. La dimensión de satisfacción con mayor porcentaje fue técnica – científica con 93,7%. El 60,3% de las madres púerperas iniciaron la lactancia materna. El 58,6% demostró una relación entre la satisfacción del contacto piel a piel y el inicio de la lactancia materna. **Conclusiones:** Los resultados demostraron la relación significativa entre la satisfacción del contacto piel a piel y el inicio de la lactancia materna, aceptando la hipótesis alterna. ($p\ 0,007 < 0,05$).

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna, Relación madre e hijo.

ASESOR: Quispe Prieto, Silvia Cristina

TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2019

Conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y su relación con la deshidratación hipernatrémica de neonatos hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Hipólito Unanue – Tacna 2018

Saravia Saravia, Diana Verónica
Yufra Rejas, Hilda Hortencia

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva y la deshidratación hipernatrémica de neonatos hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2018. Tipo de investigación cuantitativa, diseño descriptivo, de corte transversal correlacional. La población de estudio fue de 30 madres y 30 neonatos. Resultados: Las madres tienen como características predominantes adultas jóvenes (20-35 a.), 76,7% secundaria, 60% multíparas, 66,7% parto por cesárea, 100% con 37 a 42 semanas de gestación, 60% tuvo lactancia materna regular y el 73,3% inició la lactancia materna después de la segunda hora. Los neonatos: 56,7% sexo femenino, el 96,7% con apgar 9 a 5', 90% con peso normal, 56,7% con pérdida de 5 a 10% de peso y el 63,3% con fiebre y letargia, con buen conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva (56,7%), el 56,7% de neonatos tiene deshidratación hipernatrémica moderada. Conclusión: Existe relación entre conocimiento de las madres sobre lactancia materna exclusiva con deshidratación hipernatrémica según nivel de sodio sérico de neonatos hospitalizados en el servicio de neonatología del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. $p < 0,05$. término y el 75 % tenían la hemoglobina mayor a 11 gr % al parto.

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna, Deshidratación, Recién nacido.

ASESOR: Tipacti Sotomayor, Elide Eufenia
TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2019

Factores de riesgo asociados a la Hipoglucemia en el recién nacido del Hospital Regional Moquegua 2018

Estuco Loayza, Sandra
Juárez Peñaloza, Sandra Francisca

RESUMEN

El presente estudio tuvo como **Objetivo:** Determinar los factores de riesgo asociados a la hipoglucemia del Recién Nacido en el Hospital Regional Moquegua 2018. **Metodología:** La investigación es no experimental, analítico y retrospectivo, con una población de 764 recién nacidos, una incidencia de 9,82% de hipoglucemia neonatal, con una muestra de 75 recién nacidos, se conformó dos grupos, uno de casos y otro de control, cada caso con un control (1:1). **Resultados:** De los recién nacidos con hipoglucemia el 64% son de parto distócico, el 85,33% son a término, el 53,3% son grandes para la edad gestacional y los recién nacidos sin hipoglucemia el 58,67% son partos eutócicos; el 100% parto a término y el 96% con peso adecuado. **Conclusión:** Los factores de riesgo neonatales asociados a la hipoglucemia del recién nacido, son, la edad gestacional ($p=0,003$), peso del recién nacido ($p=0,003$), patologías del recién nacido ($p=0,000$) y la lactancia materna exclusiva ($P=0,049$) Los factores de riesgo maternos asociados a la hipoglucemia son, tipo de parto materno ($p=0,005$), Enfermedad materna ($p=0034$), Gravidez Materna ($p=0.190$).

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, Recién nacido, Hipoglucemia.

ASESOR: Quispe Prieto, Silvia Cristina

TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2019

Callata Colquehuanca, Mónica Soraya
Mamani Zapata, Tereza Nelly

RESUMEN

El presente estudio tiene como **Objetivo:** Determinar los factores relacionados con la incidencia de macrosomía en recién nacidos del Hospital II ESSALUD Moquegua 2017. Metodología: es un estudio descriptivo, retrospectivo, no experimental, corte transversal y correlacional. **Muestra:** conformada por 61 recién nacidos macrosómicos, durante el año 2017, a quienes se les aplicó una entrevista y la ficha de recolección de datos del recién nacido y de la madre. **Resultados:** De 426 recién nacidos en el periodo de estudio, 61(15%) fueron macrosómicos. Los factores maternos fueron: edad materna de 19 a 35 años (72%), IMC pre-gestacional de 26 a 29 (60,7%), ganancia de peso 12,5 a 18 Kg. (95,1%), antecedente de diabetes gestacional 1,6%, primiparidad 54,1%, macrosomía neonatal previa 21,3%, antecedente familiar de diabetes 19,7%, procedencia de zona urbana 59%. Los factores fetales fueron: recién nacido macrosómico masculino 63,9%, recién nacidos macrosómicos a término 100%, peso al nacimiento el 83,6% pesó entre 4 000 y 4 500 gr. **Conclusiones:** La incidencia de macrosomía en recién nacidos es de 15%; los factores maternos que se relacionan significativamente con la incidencia de macrosomía son: Edad materna ($P= 0,013$), Macrosomía neonatal previa ($P=0,015$), antecedente de algún Familiar de primer grado de consanguinidad diabético ($P=0,000$). No se encontró relación con factores fetales.

PALABRAS CLAVE: Recién nacido, Macrosomía fetal, Peso al nacer.

ASESOR: Tipacti Sotomayor, Elide Eufenia
TÍTULO: Cuidado Enfermero en Neonatología - 2019

Incidencia y características materna y perinatales del parto prematuro en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2015

Mamani Ramos, Silvia Victoria

RESUMEN

La presente investigación es un estudio retrospectivo, cuya población lo constituyeron pacientes cuya gestación culminó en parto de recién nacido vivo pretérmino, durante el año 2015, de acuerdo al informe obtenido por el Sistema Informático Perinatal de nuestro Hospital Hipólito Unanue durante el citado año, se atendieron 3510 partos, de los cuales, 224 partos fueron pretérmino, es en base a esta muestra que se inicia la investigación no experimental. Luego del análisis estadístico, se determinó que existe una incidencia de parto prematuro de 6,38%, la edad gestacional pretérmino predominó en un 79,5% estuvo comprendida entre la semana 32 a 36, la edad de las madres en estudio fue de 20 a 24 años en un 71,5% , se dio en múltiparas en un 54,5% , presentaron más de 6 controles prenatales en un 44,64%, se realizaron cesáreas en un 77,24%, el sexo femenino predominó en un 51,79%, el peso del prematuro obtenido fue en un 46,4% comprendido entre 1,500 a 2,499 gramos, en un 71,6% el apgar al nacer fue de 7 a 9, como patologías asociadas encontramos a la infección urinaria y la anemia quienes predominaron notablemente en un 21,8% y 16,0% respectivamente, el Síndrome de Dificultad Respiratoria se dio en un 35,58% y la hiperbilirrubinemia en un 27,88% como patología existente.

PALABRAS CLAVE: Trabajo de parto prematuro, Atención perinatal.

ASESOR: Huanco Apaza, Diana
TÍTULO: Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias
Obstétricas - 2017

Calderón Arriaga, Margot Deysi

RESUMEN

Introducción: Los embarazos en mujeres mayores de 35 años por lo general no presentan riesgos maternos y perinatales en su mayoría, sin embargo, hay que tener presente que hay un riesgo latente y siempre el control prenatal completo adecuado va a evitar mayores complicaciones como se pudo evidenciar en la presente tesis. **Objetivo:** Determinar la frecuencia, los riesgos y las características materno perinatales en gestantes mayores de 35 años en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante los años 2011 a 2015. **Métodos:** Estudio caso control, retrospectivo, transversal y analítico. **Resultados:** la frecuencia en los años 2011 a 2015 en el Hospital Hipólito Unanue en las gestantes mayores de 35 años fue 14 %. Características maternas: convivientes 75 %, multíparas 74 %, los controles prenatales adecuados 53 %, la edad gestacional de 37 a 40 semanas en 92 %. No se evidencia ningún riesgo materno en 54 %. Características de los recién nacidos: sexo femenino 51 %, peso de los recién nacidos de 2500 a 3999 g es de 76 %, apgar al minuto y a los cinco minutos tuvo de 7- 10 puntos 95 % y 99 %. No hubo riesgos perinatales en un 84 %. **Conclusión:** no se evidenciaron riesgos maternos ni perinatales.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, Complicaciones del embarazo, Mujeres embarazadas.

ASESOR: Pilco Velásquez, Rina
TÍTULO: Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias
Obstétricas - 2017

Perfil epidemiológico clínico y resultados perinatales de gestantes con la preeclampsia en el Servicio de Obstetricia del Hospital III Daniel Alcides Carrión ESSALUD Tacna. Período junio diciembre 2016

Llanca Ramos, Leandra Herminia

RESUMEN

El presente estudio sobre perfil epidemiológico - clínico y los resultados perinatales de gestantes con preeclampsia en el Servicio de Obstetricia del Hospital III Daniel Alcides Carrión EsSalud Tacna. Período junio a diciembre 2016. El objetivo general fue determinar el perfil epidemiológico - clínico y los resultados perinatales de gestantes con preeclampsia. Diseño de investigación: la población de estudio fueron todas las gestantes atendidas en el periodo de Julio a diciembre 2016 con diagnóstico de preeclampsia (N=43). El diseño fue observacional, retrospectivo y transversal. Resultados: se encontró que predominó el nivel educativo superior (86%), la nulípara (46,5%), embarazos a término (83,7%). Conclusión: el perfil se caracteriza por pacientes con edades 20 a 35 años (67,4%), con antecedente de hipertensión gestacional (39,5%); presencia de síndrome de Hellp (7%); preeclampsia leve (62,8%), perfil toxémico alterado (30,2%); parto por cesárea (46,5%); peso del neonato adecuado (68,9%) y Apgar vigoroso (97,8%) y mayormente sin morbilidad neonatal (86,7%).

PALABRAS CLAVE: Preeclampsia, Mujeres embarazadas.

ASESOR: Concori Cori, Gladys
TÍTULO: Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias
Obstétricas - 2017

Correlación entre el peso estimado por ecografía y el peso del recién nacido en gestantes del Centro de Salud La Esperanza – Tacna 2016

Choque Mamani, Luis Fredy

RESUMEN

Objetivo: Determinar la correlación entre el peso fetal estimado por ecografía y peso del recién nacido en el Centro de salud La Esperanza - Tacna. 2016. **Material y método:** Estudio descriptivo correlacional, retrospectivo y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 129 gestantes. **Resultados:** se demostró que existe relación significativa entre el peso fetal estimado por ecografía y el peso al nacimiento ($p = 0,000$). Donde las gestantes en su mayoría presentaron edades entre los 18 a 29 años (64,3%), con secundaria completa (63,6%), talla de 1,50 cm a 1.60 cm (62,8%), y peso materno de 64 a 76 kg (66,6%), secundíparas (38,8%) con edad gestacional de 39 y 40 semanas por ecografía (42,6% y 27,1%). El peso fetal determinado por ecografía con mayor frecuencia fueron los normopeso (73,6%), seguido del sobrepeso (24,0%) y solo el 2,3% presentaron bajo peso. Con respecto al peso real los recién nacidos presentaron Normopesos (65,1%), con sobrepeso (27,9%), macrosomicos (4,7%), y el 2,3% nació con bajo peso. **Conclusión:** Se acepta la hipótesis de trabajo: Existe relación significativa entre el peso fetal estimado por ecografía y el peso del recién nacido de gestantes a término.

PALABRAS CLAVE: Peso al nacer, Peso fetal, Recién nacido.

ASESOR: Godoy Gonzales, Edith
TÍTULO: Enfermería en Monitoreo Fetal y Ecografía
Obstétrica - 2017

Vigil Dávalos, Yusselinovich Vradislava

RESUMEN

En el Hospital Hipólito Unanue, la macrosomía fetal es considerada cuando el peso del recién nacido excede los 4000gr, generalmente este peso es obtenido por las ecografías que se realizan antes del parto. Objetivo es de determinar la frecuencia de cesáreas innecesarias por indicación de macrosomía fetal y complicaciones maternas en mujeres atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2015. Tipo de estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. La población consta de 167 mujeres a quienes se le hicieron cesárea por indicación de macrosomía fetal, y la muestra de estudio está integrada por 132 mujeres quienes cumplen con los criterios de inclusión. Conclusión principal. La primera indicación de Cesárea es la patología desproporción feto-pélvica, en la cual se encuentra la macrosomía fetal que corresponde al 9.2%(167 casos), De acuerdo a nuestra muestra de investigación conformado por 132 casos, se considera cesáreas innecesarias el 40 % (53 casos), ya que presentaron un recién nacido con peso menor de 4000grs por tanto existe una alta frecuencia de cesáreas innecesarias.

PALABRAS CLAVE: Cesárea, Macrosomía fetal.

ASESOR: Alvarez Becerra, Rina

TÍTULO: Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias
Obstétricas - 2017

Quispe Yujra, Rosa Amelia

RESUMEN

El embarazo en edad avanzada es una condición que ha aumentado en los últimos años. El objetivo fue evaluar el riesgo materno y perinatal en embarazadas mayores de 35 años. Se realizó un estudio de casos y controles, analítico y retrospectivo en todas las primigestas mayores de 35 años atendidas en el hospital Hipólito Unanue de Tacna, entre 2012 y 2015. La muestra de los casos fue 131 y de los controles 262. Se obtuvo como resultados en primigestas mayores de 35 años, el 79,4% tuvieron cesáreas (OR: 3,478, IC: 2,158 – 5,608), un 3,8% presentó muerte intrauterina (OR: 10,357, IC: 1,197 - 89,587), 15,3% de los neonatos fueron prematuros (OR: 2,5967, IC: 1,3098 - 5,1479), ápgar al minuto un 3,8 % tuvieron un puntaje menor de 3 (OR: 10,357, IC: 1,197 - 89,587); el 7% de neonatos fueron de bajo peso (OR: 3,3637, IC: 1,415 – 7,933). Por lo tanto, se concluyó que la edad materna se asoció significativamente en forma independiente con resultados maternos y perinatales adversos.

PALABRAS CLAVE: Edad materna, Embarazo de alto riesgo, Morbilidad.

ASESOR: Linares Torres, Carmen
TÍTULO: Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias
Obstétricas - 2017

Factores maternos asociados a la preeclampsia en pacientes atendidas en el Hospital de Apoyo Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo de 2013-2015

Acho Salcedo, Patricia Luzmila

RESUMEN

Objetivo Determinar los factores maternos asociados a preeclampsia en pacientes atendidas en el hospital de apoyo Hipólito Unanue de Tacna, durante el periodo de 2013 – 2015. **Método:** el estudio fue descriptivo retrospectivo de corte transversal. **Muestra:** 212 gestantes con preeclampsia atendidas en el hospital de apoyo Hipólito Unanue de Tacna. Se obtuvo la información de las variables a través de una ficha de recolección de datos. **Resultados:** Encontramos PE. Leve con 193 y PE. Severa con 19 pacientes, que representa el 91,04% y 8,96 % respectivamente. La obesidad y sobrepeso pre gestacional se presentan con 36,32 % y 32,08%; la ganancia de peso gestacional adecuada con 40,57% y la baja ganancia con 34,43%; se encontró asociación en P. severa (p valor de 0.002) con los controles prenatales deficiente e inadecuado con 3,77% y 2,83%; en cuanto a la paridad tenemos múltíparas con 50,94% y nulíparas con 48,11%. No hay asociación con la edad materna, antecedente familiar o personal de preeclampsia y presencia de enfermedades maternas en el embarazo. **Conclusiones:** el factor materno asociado a preeclampsia fue el control deficiente e inadecuado, seguido de la obesidad y sobrepeso previo al embarazo.

PALABRAS CLAVE: Mujeres embarazadas, Preeclampsia.

ASESOR: Pilco Velásquez, Rina
TÍTULO: Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias
Obstétricas - 2017

241 **Factores maternos y perinatales en el embarazo prolongado diagnosticado por ecografía en el Hospital Hipólito Unanue-Tacna,2016**

Miranda Maquera, María Emilia

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar los factores maternos y perinatales en el embarazo prolongado diagnosticado por ecografía en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el año 2016. Es un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 71 gestantes por unanimidad. El método de recolección de datos: fue una ficha de recolección de datos realizado mediante la observación de datos registrados en la historia clínica y para su procesamiento se utilizó un paquete estadístico SPSS versión 25; teniendo como resultado que; la incidencia fue de 0,021; los factores maternos son: oligohidramnios y anemia (16,9 %), desproporción céfalo - pélvica (15,5 %), insuficiencia placentaria (9,9 %) y diabetes (2,8 %) y los factores perinatales son: macrosomía fetal (28,2 %), sufrimiento fetal (8,5 %), síndrome de aspiración meconial (4,2 %) y malformaciones congénitas (2,8 %). Se concluye que, los resultados maternos y perinatales se presentaron en el embarazo prolongado diagnosticado por ecografía.

PALABRAS CLAVE: Embarazo prolongado, Ultrasonografía.

ASESOR: Escobar Bermejo, Gloria Regina

TÍTULO: Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica - 2018

Parto Vaginal en pacientes con antecedentes de cesárea y complicaciones materno-perinatales en el Hospital Hipólito Unanue. Tacna 2014-2015

Sosa Yujra, Flora Valuisa

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el parto vaginal en pacientes con antecedente de cesárea y complicaciones materno - perinatales en el Hospital Hipólito Unanue. Tacna 2014 – 2015. **Metodología:** Es una investigación de tipo relacional, retrospectiva no experimental, de corte transversal y se realizó en 84 paciente gestantes con antecedentes de cesárea previa. **Resultados:** la duración del periodo expulsivo menor o igual a 20 minutos (89.2%), en cuanto a duración/forma de alumbramiento el 72.6% dirigido y el 27.4% tuvo una duración de mayor o igual que 15 minutos. En cuanto al tipo del alumbramiento y la cantidad de sangrado, tiene que Schultze como Duncan el 65,6% presentaron un sangrado no más de 200 CC. El Peso del R.N./ Edad gestacional promedio oscila entre 3501-4000grs / de 38-41 semanas. Las complicaciones que presentaron desgarro perineal I° y retención de membranas un 16.7%. En el Apgar de R.N. de 95.2% de 7-10. **Conclusión:** No existe relación significativa entre pacientes con antecedente de cesárea previa y complicaciones del parto vaginal (83.3%), y no presentó ninguna complicación mientras que sólo el 16,7% presentó desgarro I° y membranas.

PALABRAS CLAVE: complicaciones del trabajo de parto, Parto vaginal después de cesárea.

ASESOR: Pérez Cabanillas, Nérida
TÍTULO: Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias
Obstétricas - 2018

Valor predictivo del test estresante en el diagnóstico de sufrimiento fetal en gestantes atendidas – Hospital Santa Rosa – Puerto Maldonado año 2016

Mendoza Mamani, Katty Giovana

RESUMEN

El objetivo es determinar el “Valor Predictivo del Test Estresante en el diagnóstico de sufrimiento fetal en gestantes atendidas- Hospital Santa Rosa- Puerto Maldonado año 2016”. El diseño de la investigación es no experimental, retrospectivo y transversal. La población de 98 gestantes. Se aplicó un instrumento validado. Los datos fueron procesados por el programa estadístico IBM Sattistics SPSS versión 25. Se encontró, que el 81,63% predomina el resultado negativo del Test Estresante, 78,57% presentó Apgar normal al minuto, 98,98% Apgar normal a los 5 minutos, 73,47% líquido amniótico claro. Se concluye que el Test Estresante en el diagnóstico de sufrimiento fetal basado en los resultados del puntaje de Apgar y líquido amniótico tiene una sensibilidad de 76,07%, especificidad de 91,50%, valor predictivo positivo aproximado de 57,68% y valor predictivo negativo de 92,92%.

PALABRAS CLAVE: Sufrimiento fetal, Puntaje de apgar, Líquido amniótico, Mujeres embarazadas.

ASESOR: Barreda Grados, Juana Inés

TÍTULO: Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica - 2019

Test no estresante en relación al apgar del recién nacido en gestantes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el periodo de Enero – Junio 2016

Gonzales Melchor, Ana Mariela

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el Test no Estresante y el Apgar del Recién Nacido en gestantes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el periodo de enero – junio 2016. **Metodología:** Estudio no experimental, retrospectivo, transversal. De diseño correlacional. **Resultados:** El test no estresante en relación al Apgar del recién nacido, del 100 % el 95,7 % tuvieron un Apgar al minuto mayor igual a 7 puntos, el 4,3% el Apgar al minuto fue menor a 7 puntos al minuto; asimismo del 100% el 98,3 % el Apgar a los 5 minutos fue mayor e igual a 7 puntos y el 1,7% tuvo un Apgar a los cinco minutos menor a 7 puntos. La relación entre el test no estresante y el Apgar al 1' del recién nacido ($P=0,042$) y a los 5' del recién nacido ($P=0,000$). Si hay relación estadísticamente significativa. **Conclusión:** Se concluye que, si existe relación entre el test no estresante y el Apgar del recién nacido en gestantes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2016

PALABRAS CLAVE: Puntaje de apgar, Recién nacido.

ASESOR: Alvarez Becerra, Rina

TÍTULO: Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica - 2019

245 **Valor predictivo de la ultrasonografía para el ponderado fetal en relación al peso del recién nacido en el Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018**

Huanqui Romero, Lucero Victoria

RESUMEN

El presente estudio sobre “Valor predictivo de la ultrasonografía para el ponderado fetal en relación al peso del recién nacido en el Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2018”, tuvo como objetivo general estimar el Valor Predictivo de la ultrasonografía en cuanto al ponderado fetal, demostrado a través del peso del recién nacido. Diseño de investigación: la población de estudio fueron las gestantes en las que se realizó ponderado fetal y que cumplieron criterios de selección (N=204). El diseño fue observacional, retrospectivo y transversal. Resultados: se encontró que la mayoría de gestantes tenían edad reproductiva ideal (72,55%), de educación secundaria (55,39%). Las ecografías fueron realizadas por el residente en 61,76% y por el asistente en 38,24%. El ponderado fetal detectó macrosomía en 1,96%, pero el 5,39% de niños nacieron macrosómicos; hubo una concordancia de 64%, con una sobreestimación del peso en 9,31% de casos y subestimación en 15,69%. El valor predictivo positivo de la ultrasonografía fue de 94,50%, y el valor predictivo negativo fue de 50%. Se concluye que la ultrasonografía en la etapa a término del embarazo tiene un alto valor predictivo positivo en la determinación del peso del recién nacido.

PALABRAS CLAVE: Peso al nacer, Ultrasonografía prenatal, Valor predictivo de las pruebas.

ASESOR: Álvarez Becerra, Rina
TÍTULO: Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica - 2019